

VITAPLUS® boulardii

VITAPLUS® boulardii

Saccharomyces cerevisiae var. *boulardii* CNCM I-3799 500 mg
Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) 1x10¹⁰ UFC
Fructooligosacáridos (FOS) Actilight® 500 mg

GASTROENTERITIS AGUDA | PREVENCIÓN DAA | Prevención DIARREA DEL VIAJERO |
DIRREA AGUDA | Prevención de la infección recurrente asociada a *C.Difficile* | Infección
por *H.pylori* | CANDIDIÁSIS asociada a antibiótico

INGREDIENTES

Edulcorante: isomaltosa; *Saccharomyces cerevisiae* var. *boulardii* CNCM I-3799 (2x10¹⁰ UFC*/g) 500 mg; Fructooligosacáridos (FOS) Actilight® 500 mg; *Lactobacillus rhamnosus* GG (ATCC 53103) (3.5x10¹¹ UFC*/g) 28.75 mg (equivalente a 1x10¹⁰ UFC*); Aroma: nata; Antiaglomerante: dióxido de silicio.
*Unidades Formadoras de Colonias

DOSIS Y RECOMENDACIONES DE USO

La dosis diaria recomendada, en niños y adultos, es de 1 stick bucodispersable, justo o durante alguna de las comidas. El producto está diseñado para ser ingerido directamente. No es necesario mezclarlo con los alimentos o diluirlo en agua; aunque si se prefiere, puede tomarse diluido o combinado con otros alimentos, como por ejemplo zumos, batidos, yogures, etc.

Saccharomyces boulardii y *Lactobacillus rhamnosus* GG son considerados con nivel de recomendación fuerte en caso de Prevención de Diarrea Asociada a Antibióticos¹ y son recomendados junto con la terapia de rehidratación oral en Diarrea Aguda en niños².

PRECAUCIONES DE USO

Sin gluten. Sin lactosa. Con edulcorante. Contenido en azúcares (0.47g/stick). Apto para vegetarianos. Apto para niños. No administrar a pacientes en estado crítico o inmunodeprimidos o portadores de un catéter venoso central. Es compatible con la toma de antibióticos. No superar la dosis diaria recomendada. No debe utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada, y de un estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los más pequeños. No tomar en caso de alergia conocida o sospecha a uno o más de los ingredientes.

CONSERVACIÓN

Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz directa del sol, a una temperatura inferior a 25°C. No requiere refrigeración. La fecha indicada garantiza la integridad del producto, siempre y cuando este se conserve de forma correcta.

CARACTERÍSTICAS

10 sticks bucodispersables
Complemento alimenticio
CN 177214.5

Distribuido por:

PlusQuam Pharma, S.L.

Polígono Industrial El Carrascal, 21

06140 Talavera la Real, Badajoz - España

www.plusquampharma.com



(1) Szajewska, H. et col. Probiotics for the Prevention of Antibiotic-Associated Diarrhea in Children, *Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition*: March 2016 - Volume 62 - Issue 3 - p 495-506.

(2) Guarino, A. et col. European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition/European Society for Pediatric Infectious Diseases Evidence-Based Guidelines for the Management of Acute Gastroenteritis in Children in Europe, *Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition*: July 2014 - Volume 59 - Issue 1 - p 132-152.

*Unidades Formadoras de Colonias